



Autoimmunity Research Foundation

3423 Hill Canyon Ave, Thousand Oaks, CA 91360
Californië, Verenigde Staten
www.AutoimmunityResearch.org

e-mail: Foundation@AutoimmunityResearch.org
telefoon: +1-805-492-3693

Aan zorgverleners die deze patiënt behandelen in een noodsituatie:

Deze patiënt neemt routinematig elke vier uur Olmetec (Olmesartan medoxomil) 40mg, als onderdeel van een klinische studie met antibacteriële middelen bij chronische ontstekingsziekten. Het is essentieel dat deze dosering Olmesartan volgens dit schema wordt voortgezet, zelfs in geval van hypotensie. Het abrupt staken kan levensbedreigend zijn.

Deze patiënt neemt ook gepulseerde antibiotica die kunnen leiden tot een cytokinenstorm waardoor interventie noodzakelijk kan zijn. Mogelijke symptomen van cytokinenstorm kunnen zijn:
symptomen van een naderend myocardinfart (pijn, transpireren, misselijkheid, hartkloppingen)
alarmerende kortademigheid, vooral indien vergezeld van perifeer oedeem
alarmerend gevoel van een dichtgeknepen keel

Naast de routineuze levensreddende handelingen is het van essentieel belang dat **de Olmesartan elke vier uur wordt gegeven, zo nodig ook 20mg sublinguaal, zelfs in geval van nasogastrische intubatie.**

Als de bloeddruk extreem laag is (gemiddelde arteriële bloeddruk < 55), continueer dan de Olmesartan zoals boven omschreven en breng het extracellulair volume op peil met fysiologische zoutoplossing of erythrocytenconcentraat.

Deze antibiotica veroorzaken gewoonlijk ofwel een allergische reactie of een cytokinenstorm:

- azythromycine (let met name op cardiovasculaire sequelae)
- clindamycine (let met name op neurologische sequelae)
- tetracyclines
- sulfa-antibiotica

Fluorochinolonen worden over het algemeen goed verdragen, hoewel er gevallen bekend zijn van peeschade. De patiënt dient te worden gewezen op de waarschuwingen van EMEA.

Cefalosporinen **zouden** kunnen worden verdragen, Claforan gaat meestal goed.

De macrolide Claritromycine gaat meestal goed.

Geef op geen enkele wijze corticosteroiden (injectie, inhalatie, oraal of IV) daar dit kan leiden tot metabolische instabiliteit.

Ongewenste bijwerkingen treden dikwijls op als epinefrine of norepinefrine wordt gebruikt om de bloeddruk te verhogen of om anafylaxis te behandelen. **Gebruik epinefrine of norepinefrine alleen bij hartstilstand.**

Plaatselijke verdovingsmiddelen die epinefrine bevatten kunnen ongewenste bijwerkingen veroorzaken (tachycardie, psychose). De epinefrine kan de anesthesie hinderen.